



Schilddrüsenszintigraphie

Anwendungsgebiete:

- Tastbare und / oder sonografisch abgrenzbare Knoten
- V.a. Autonomie, Überfunktion, latente Hyperthyreose
- Nach definitiver Therapie (Strumektomie oder Radiojodtherapie) zur Dokumentation des Therapieerfolgs
- Differenzierung einer Schilddrüsenentzündung (Abgrenzung gegenüber Morbus Basedow/ Hashimoto/ de Quervain)

Kontraindikationen:

- Schwangerschaft (relative Kontraindikation) und in der Stillzeit strenge Indikationsstellung (Unterbrechung für 48 h)
- Jodhaltige Kontrastmittelgabe 2-4 Wochen (relative Kontraindikation)

Vorbereitung: Es ist keine spezielle Vorbereitung erforderlich, aber alle eingenommenen Medikamente sind anzugeben, weil sie u. U. für die Interpretation der Befunde relevant sein können. Anzugeben ist die letzte jodhaltige Kontrastmitteluntersuchung (falls erfolgt). Falls die Überweisung nur zu der Schilddrüsenszintigraphie ausgestellt ist, sind Laborwerte (insbesondere TSH) erforderlich, bitte bringen Sie entsprechende Ausdrucke mit.

Untersuchungsdauer: ca. 1 Stunde.